

元気な農業



<第2号>

JA富士宮 経済部

平成27年 7月 3日 発行

東海地方も梅雨入りし、ジメジメした天候が続いています。
また、今年は、晴れから雨に急に天気が変わるなど、農作業の予定が立てづらい日々が多いですね。東海地方の1か月予報（名古屋地方気象台6月25日発表）では、曇りや雨の日が多く、気温も低くなる可能性もあるそうです。

急な気温の変化で体調を崩さないよう、休憩を十分にとりましょう。



水稻の病害虫発生予察情報

○葉いもち・穂いもち

曇雨天で日照不足が続くと発生しやすくなります。置き苗は本田の苗より早期に発生しやすく、伝染源になりやすいため不要な苗は速やかに処分しましょう。

△紋枯病

気温が低い予報となっているため、発生しやすくはありませんが、気温の上昇とともに発生が懸念されます。

□カメムシ

静岡県中遠地域でカメムシが多発しています。東部でも懸念されますので、発生源となりやすいカヤツリグサ科・イネ科雑草等の除草をしましょう。

○葉いもち・穂いもち

△紋枯病 □カメムシ

★イモチエーススタークル粒剤3キロ粒剤 **5,120円**

使用量 3kg/10a

使用時期 収穫35日前まで

目安

連休中田植え → 散布時期 7月20日前後

★ダブルカットバリダトレボン粉剤3DL **2,474円**

使用量 3~4kg/10a

使用時期 穂揃期まで

目安

連休中田植え → 散布時期 7月25日前後




使用後、スタークル粉剤DLの使用が効果的です。

夏の野菜管理

トマト

いろいろな病虫害が発生しやすくなりますが、オオタバコガ・サビダニ等
今後、増えてくる時期になります。早めに防除を行いましょう




アフーム乳剤 100g 2000倍

2,279円

落花生


黒渋病・褐斑病・そうか病等の発生が懸念される時期になります。

葉に斑点が生じて、生育に影響が出ます。



ジマンダイセン水和剤 500g 400~600倍

994円




トップジンM水和剤 500g 1500~2000倍

2,355円

その他

キュウリ・メロン・タマネギ・レタス等、べと病が発生しやすい時期に
なります。葉などに褐色の斑点が現れてひろがり、進行すると、べとついた
感じになります。



アミスター20フロアブル 1500~2000倍

3,480円



INFORMATION



平成28年まき用 稲種子注文書について

JAでは、平成28年まき用の稲種子の注文を受け付けております。
種子更新をしないと品種固有の特性が失われ、品質・収量が低下する場合が
あります。良質米の生産のために、毎年種子更新をしましょう。

注文についてはお近くの支店へお願い致します。

平成28年春植え付け用馬鈴薯の予約について

JAでは、平成28年春植え付け用の種馬鈴薯の予約受付を行っております。
圃場検査合格証付の北海道産種馬鈴薯です。是非ご注文ください。
また、本年度より、安定した量の確保ができない等の理由から、“ワセシロ”
の注文がございません。昨年ご注文頂いた方についてはご注意下さい。